Formulaire de diagnostic médical pour athlètes avec déficience visuelle

Le formulaire doit être complété en Anglais par un ophtalmologiste enregistré. ??
Toute la documentation médicale demandée en pages 2 et 3 doit être jointe.
le formulaire et les pièces médicales jointes ne doivent pas dater de plus de 12 mois au moment de l'évaluation de l'athlète.

Rensignements sur le sportif

Nom de famille : _____

Prénom : _____

Sexe : F❑ M ❑ Date naissance : _____

Sport : _____ IF registration ID ???? (le cas échéant) _____

NPC/NF : _____

Information médicale :

Diagnostic :

Historique médical :

Age de début : _____

Intervention(s) prévue(s): _____

Athlète portant des lunettes : ❑ oui ❑ non Correction: Droite : _____ Gauche : _____

Athlète portant des lentilles de contact: ❑ oui ❑ non Correction : Droite : _____ Gauche : _____

Athlète portant des prothèses oculaires : ☐ droite ☐ gauche

Traitement :

Médication oculaire utilisée par l'athlète :	
Allergies aux médicaments oculaires :	

Sportif :

Evaluation de l'acuité visuelle et du champ de vision :

Acuité visuelle

	Œil droit	Œil gauche
Avec correction		
Sans correction		

Type de correction : _____

Méthode de mesure : _____

Champ de vision :

En degrés (diamètre)	Œil droit	Œil gauche

Pièces jointes au formulaire de diagnostic médical

1. **Test du champ de vision**

Pour les athlètes avec un champ de vision réduit, un test de champ de vision doit être joint à ce formulaire.

Le champ de vision de l'athlète doit être évalué par un test ciomplet (120 degrés) et un test de la vision centrale à 30 degrés, 24 degrés ou 10 degrés selon la pathologie.

Oun des périmètres suivants devra être utilisé pour l'évaluation : périmétrie de Goldmann (niveau ? ou intensité III/4) , analyseur de champ d'Humphrey ou Octopus (Interzeag)???

2. **Documents médicaux supplémentaires (obligatoires)**

Merci de préciser par quel problème oculaire l'athlète est affecté.

Problème oculaire	**Documents médicaux supplémentaires exigés (voir ci-dessous)**
☐ Maladie antérieure	aucun
☐ Maladie maculaire	▪ OCT maculaire ▪ ERG de modèle ou multifocal* ▪ Potentiel Evoqué Visuel (PEV)* ▪ Apparition du modèle PEV ???*
☐ Maladie de la rétine périphérique	▪ ERG complet* ▪ pattern ou modèle ??? ERG*
☐ Maladie du nerf optique	▪ OCT ▪ ERG complet* ▪ Modèle ??? PEV* ▪ Apparence ??? du modèle VEP*
☐ Maladie neurologique / corticale	▪ Modèle ??? PEV* ▪ pattern ou modèle ??? ERG* ▪ Apparence ??? du modèle VEP*

Athlète :

Les signes oculaires doivent correspondre au diagnostic et au degré de perte de vision. Si le problème oculaire est évident et visible et explique la perte de vision, aucun document médical supplémentaire n'est nécessaire.Sinon, les documents médicaux supplémentaires mentionnés dans le tableau ci-dessus doivent être joints à ce formulaire. Si la documentation médicale est incomplète, les classificateurs ne seront pas capables d'affecter une classification.

*Notes sur les examens électrophysiologiques (PEVs et ERGs) :
Lorsqu'il y a divergence ou une possible divergence entre le degré de perte visuelle et la preuve visible de la maladie oculaire, l'utilisation de l'électrophysiologie visuelle est souvent utile pour prouver le degré du handicap.

Les informations communiquées doivent inclure le rapport du laboratoire ayant effectué les tests, les copies des documents originaux, la plage des données normatives pour ce laboratoire, une déclaration précisant l'équipement utilisé et l'état du calibrage. Les examens sont effectués en tenant compte des minimum prescrits par la société internationale d'exploration de la vision et d'électrophysiologie (ISCEV) (http://www.iscev.org/standards/).

Un électrorétinogramme (ERG) complet ??? teste la fonction de la rétine entière en réponse à de brefs éclairs de lumière, et peut séparer les fonctions des batonnets? ou des cones ?mediateurs (SOS????). Cependant il ne donne pas d'information sur la fonction maculaire.

- Un pattern ??? Modèle ERG teste la fonction centrale rétinienne, animée ?? par les cones ?? cornets maculaires, mais provenant surtout des cellules du ganglion rétinien.
- Un ERG multifocale teste la partie centrale (environ un diamètre de 50 degrés) et produit une représentation topographique de l'activité de la rétine centrale.

Un potentiel cortical visuel évoqué (VEP) enregistre le signal produit ??? dans le cortex visuel primaire , (V1), en réponse soit à un stimulus de modèle soit en réponse à un signal de lumière. Une absence ou anormale VEP n'est pas une évidence d'un problème spécifique du nerf optique ou problèmes du cortex visuel à moins que le fonctionnement normal due la rétine centrale ait été démontré.

- Une apparence du modèle VEP ??? iest la version spécialisée du VEP utilisée pour établir le seuil ?? pourcentage visuel qui peut etre utilisé pour démontrer objectivement la capacité visuelle au niveau du cortex primaire ??? principal visuel.

☐ **Je confirme la véracité des informations ci-dessus.**
☐ **Je certifie qu'il n' y a pas de contre-indication pour cet athlète à concourir à un niveau compétitif ?? (ou participer à des a des competitions)** Nom :

Spécialité médicale :

Numéro au registre :

Adresse :

Ville : Pays :

Téléphone : E-mail :

Date : Signature :